

Lea todo el prospecto detenidamente antes porque contiene información importante para usted.
Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, usted debe utilizar con cuidado **Supositorios de glicerina Glycilax** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de seis días debe consultar a su médico.

En este prospecto se explica:

1. Qué es **Supositorios de glicerina Glycilax** y para que se utiliza.
2. Antes de usar **Supositorios de glicerina Glycilax**.
3. Cómo usar **Supositorios de glicerina Glycilax**.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de **Supositorios de glicerina Glycilax**.

Supositorios de glicerina **GLYCILAX**
Glicerol

Cada supositorio contiene: 3,31 g de glicerol como principio activo.
Los demás componentes (excipientes) son: ácido esteárico e hidróxido sódico.

Titular y responsable de la fabricación:

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A. Julián Camarillo, 35 - 28037 Madrid (España)

1- QUÉ ES Supositorios de glicerina Glycilax Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Los **Supositorios de glicerina Glycilax** son 12 supositorios envasados en blisters de aluminio/polietileno. Es un laxante que se administra por vía rectal. El efecto laxante se consigue por la capacidad del glicerol de ablandar las heces que junto con una ligera acción irritante local consigue estimular los movimientos intestinales. Los **Supositorios de glicerina Glycilax** están indicados para el alivio local sintomático del estreñimiento transitorio y ocasional.

2- ANTES DE USAR Supositorios de glicerina Glycilax

Este medicamento es para usar por vía rectal, no debe ingerirlo.

No use Supositorios de glicerina Glycilax

- Si padece o ha padecido reacción de hipersensibilidad después del uso de glicerol o de alguno de los componentes (excipientes).
- Si presenta afecciones anorrectales, rectocolitis hemorrágica y procesos inflamatorios hemorroidales.
- Si tiene retortijones, cólicos, náuseas y vómitos u otros signos de apendicitis, obstrucción intestinal, otras dolencias intestinales inflamatorias agudas o, en general en cualquier situación de dolor abdominal sin conocer la causa.

TENGA ESPECIAL CUIDADO CON Supositorios de glicerina Glycilax

- Si usa este medicamento durante largos períodos de tiempo, puede producirse el síndrome de colon irritable.
- En caso de aparición de sangre en heces, irritación, dolor o si no tiene mejoría en los hábitos intestinales, debe interrumpir el tratamiento y consultarlo con el médico.

Este medicamento se utilizará únicamente bajo estricto control médico en pacientes con cuadros patológicos graves, especialmente cardiovasculares.

No utilizar durante más de una semana.